

PRIJEOPERACIJSKA OBRADA
ZA VELIKE OPERATIVNE ZAHVATE
(UGRADNJA PROTEZE, OSTEOTOMIJA)
UPUTE PACIJENTIMA



Specijalna bolnica za
ortopediju i traumatologiju

Poštovani,

naručeni ste za prijem u Specijalnu bolnicu za ortopediju i traumatologiju
lokomotornog sustava „Akromion“ radi operacijskog liječenja.

Ljudevita Gaja 2
49217 Krapinske Toplice
tel. 049 587 487
fax. 049 587 488
akromion@akromion.hr
www.akromion.hr

Obzirom da se kod predviđenog zahvata radi o operaciji većeg opsega koja može biti vezana i uz određeni gubitak krvi te može bitnije utjecati i na opće stanje Vašeg organizma, molimo Vas da u sklopu prijeoperacijske obrade obavite slijedeće obavezne pretrage:

**krvna grupa+Rh faktor, KKS (E, Hb, Htc, L, Trc), koagulogram (PV, APTV, INR),
elektroliti (Na, K), GUK, ureja, kreatinin, EKG.**

Dodatna obrada za pacijente:

starije od 60 godina: **RTG srca i pluća;**

naručene ZA UGRADNJU ENDOPROTEZE zgloba: **urinokultura** (napraviti što prije! jer se nalaz dugo čeka), **bris nosa i ždrijela; Krvna grupa+Rh faktor uz testove senzibilizacije** (ukoliko ste u međuvremenu primali transfuziju krvnih pripravaka, treba napraviti novu KG i nove testove senzibilizacije).

Ako ste naručeni za ugradnju/zamjenu endoproteze zgloba, nalaz Vaše krvne grupe te nalaze urinokulture i briseva SVAKAKO pošaljite što je moguće prije faksom na slijedeći broj:

fax: 049 587 476

ili ga prosljedite na e-mail:

nalazi@akromion.hr

U polju naziva e-maila (subject/predmet) **obavezno** navedite **ime i prezime pacijenta** za kojeg se nalazi šalju.

Ukoliko vam laboratorij u kojem ćete raditi nalaze nudi opciju izravnog slanja nalaza u bolnicu molim vas da im također navedete e-mail adresu nalazi@akromion.hr

Postoji mogućnost, ukoliko to Vaše zdravstveno stanje ili složenost operacije zahtijeva, da budete upućeni na neke dodatne pretrage, o čemu ćete biti vrlo brzo obaviješteni.

Ako još niste dogovorili točan datum Vaše operacije, bit ćete o tome na vrijeme obaviješteni telefonom. Ukoliko imate dodatnih pitanja ili je u međuvremenu došlo do značajne promjene Vašeg zdravstvenog stanja, nazovite nas na broj **049 587 487.**

Molimo Vas da sa sobom u bolnicu ponesete sve Vaše lijekove koje trenutno uzimate, važna otpusna pisma te RTG/CT/MR slike i nalaze vezane uz Vaše sadašnje stanje, te **originalne nalaze gore navedenih pretraga**, koje ćete obaviti u sklopu prijeoperacijske obrade. Ukoliko se redovito kontrolirate radi nekog kroničnog zdravstvenog problema posljednji nalaz liječnika pod čijim ste nadzorom.

Svi operacijski zahvati izvode se isključivo u bolnici u Krapinskim Toplicama!

Svrha ove prijeoperacijske obrade jest da nam pomogne u pružanju Vam najbolje moguće skrbi prije, tijekom i nakon Vašeg boravka u bolnici.

Ukoliko dolazite u bolnicu na dan operacije, morate doći **NATAŠTE** (ništa ne jesti).

Ako dolazite u bolnicu ujutro na dan operacije, smijete prije polaska, ali NE kasnije od 6 sati ujutro, popiti 2-3 decilitra tekućine (voda, bistri sok, čaj, slatka crna kava uz malo mlijeka).

Kako postupati sa lijekovima prije dolaska na operativni zahvat?

Obavezno nam na vrijeme dajte do znanja ukoliko trošite neki od lijekova protiv zgrušavanja krvi (Martefarin/Marivarin, Pigrel/Plavix/Zyllt/Klopidex, Tagren, Aggrenox, Xarelto, Pradaxa...) jer će ih vjerojatno biti potrebno izostaviti 3 do 7 dana prije operativnog zahvata.

Ukoliko redovito uzimate acetilsalicilnu kiselinu (Aspirin, Andol, Cardiopirin..) u načelu je možete nastaviti uzimati do dana operacije.

Ukoliko bolujete od **dijabetesa** i uzimate inzulin ili tablete za kontrolu razine šećera u krvi iste treba izostaviti ujutro na dan operacije.

Lijekove koji se uzimaju radi bolesti **štitnjače** potrebno je nastaviti uzimati i na dan operacije.

Lijekove za kontrolu povišenog **krvnog tlaka** također je u načelu potrebno redovito nastaviti uzimati osim ukoliko od našeg anesteziologa prilikom prijeoperacijskog telefonskog kontakta niste dobili drugačije upute.

Ukoliko redovito uzimate **lijekove protiv bolova** iz skupine nesteroidnih protuupalnih lijekova (npr. Ibuprofen/Brufen, Voltaren, DicloDuo, Naklofen, Ketonal, Knavon i sl.) bilo bi ih poželjno izostaviti 5 dana prije operativnog zahvata i u tom razdoblju po potrebi zamijeniti lijekovima koji ne utječu na zgrušavanje krvi poput paracetamola i tramadola (Plicet, Lupocet, Panadol, Zaracet, Zaldiar, Tramal...)

Ukoliko je to potrebno detaljnije upute u vezi priprema za operaciju i postupanja sa lijekovima koje eventualno trošite dobiti ćete od anesteziologa naše bolnice koji će Vas telefonski kontaktirati nekoliko dana prije operativnog zahvata.